

По нашим наблюдениям, разноцветные ящурки линяют клочьями, при этом с туловища покровы сходят нередко одним куском (правда, сильно изорванным), а голова, хвост и лапы линяют несколькими клочьями, отдельно. Сброшенные покровы чаще всего обнаруживали у входов в норки, заселенные ящурками.

Институт зоологии АН УССР

Поступила в редакцию  
8.XII 1980 г.

УДК 595.792

Е. Н. Хлопунов

**НОВЫЙ ВИД РОДА *Ooencyrtus* ASHMEAD, 1900  
(HYMENOPTERA, ENCYRTIDAE) ИЗ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР**

Типовые материалы хранятся в коллекции Зоологического института АН СССР (Ленинград).


Автор выражает сердечную благодарность В. А. Тряпицыну (Зоологический институт АН СССР, Ленинград) за ценные советы при выполнении работы.

*Ooencyrtus solidus* Khlopunov, sp. n.

Материал. Нижняя Вырка, окр. Калуги, суходольный луг. (А. Белов), 26.VIII 1978, 1 ♀ (голотип), 1 ♀ (паратип), усик, переднее и заднее крылья паратипа в препарате № 44к; (Е. Хлопунов), 26.VIII 1978, 1 ♂ (паратип). Верхняя Вырка, окр. Калуги, опушка смешанного леса (Е. Хлопунов), 6.VI 1978, 1 ♂ (паратип). Сивково, окр. Калуги, суходольный луг (Е. Хлопунов), 27.VIII 1978, 2 ♀ (паратипы); разнотравье, 28.VI 1977, 1 ♂ (паратип), усик паратипа в препарате № 48 к; (А. Белов), 24.VIII 1978, 1 ♂ (паратип).

Самка. Высота головы немного меньше ее ширины (рис. 1, 1). Ширина темени и лба в 4 раза меньше наибольшей ширины головы. Длина темени и лба в 1,5 раза больше их ширины. Глазки в остроугольном треугольнике (рис. 1, 2). Вершинный угол глазкового треугольника составляет примерно 80°. Расстояние между передним и задним глазками равно расстоянию между задним глазком и краем затылка и немного меньше расстояния между задними глазками. Расстояние между глазком и краем глаза меньше диаметра глазка. Длина щеки примерно в 1,5 раза меньше длины глаза. Усиковые ямки расположены ниже уровня нижнего края глаз. Расстояние между усиковыми ямками немного больше расстояния между усиковой ямкой и краем глаза и почти в два раза больше расстояния между усиковой ямкой и краем рта. Строение усика на рис. 1, 3. Соотношение длины основного членика, поворотного членика, членика жгутика и булав усиков к их ширине примерно следующее: 33 : 6; 12 : 5; (6 : 4; 6 : 4; 7 : 4; 8 : 4; 9 : 5; 8 : 5); 25 : 7. Грудь уже головы. Ширина щита среднеспинки в 2,8 раза больше его длины. Щитик немного длиннее щита среднеспинки. Ширина щитика больше его длины. Крылья не укороченные. Переднее крыло больше чем в 2 раза длиннее своей ширины. Жилкование переднего крыла на рис. 1, 4. Шпора средней голени короче первого членика средней лапки. Брюшко короче груди. Яйцеклад не выступает или слегка выступает.

Лицо темное с голубоватым оттенком, щеки с зеленоватым оттенком. Темя и лоб темные с зеленоватым оттенком и бронзовым блеском. Крыловые крышечки темные. Щит среднеспинки темный с зеленоватым

Рис. 1. *Ooencyrtus solidus* sp. n.:

Самка: 1 — голова, вид спереди; 2 — то же, вид сверху; 3 — усик; 4 — жилки крыла; 5 — основная часть переднего крыла; 6 — щитик; самец; 7 — усик.

оттенком и бронзовым блеском. Бока среднегруди темно-фиолетовые, блестящие. Щитик темный, матовый. Ноги светло-коричневые, задние бедра слегка затемнены. Основная половина средних и задних тазиков затемненная, или все тазики светло-коричневые.

Темя и лоб сетчатые с 4 рядами точек. Щит среднеспинки сетчатый. Щитик в сетчатой скульптуре. По бокам щитика элементы сетчатости вытянуты в длину (рис. 1, 5). В срединной части щитика длина каждого элемента сетчатости примерно равна его ширине.

Глаза опушенные. Темя, лоб и щитик в редких волосках темного цвета. Щит среднеспинки в белых волосках. Основание диска переднего крыла опушенное. Голая косая полоска сзади замкнутой.

Длина тела 0,98—1,00 мм.

Самец похож на самку. Строение усика на рис. 1, 7.

Длина тела 0,60—0,80 см.

Новый вид близок *O. telenomicida* Vassiliev, описанному по материалам из Купянского р-на Харьковской обл., где он был выведен из яиц вредной черепашки *Eurygaster integriceps* Puton, которые были заражены *Telenomus chloropus* Thoms. (Vassiliev, 1904).




Рис. 2. *Ooencyrtus telenomicida* (по Ferriere et Voegelé, 1961):

Самка: 1 — щиток; 2 — усик; 3 — основная часть переднего крыла; самец: 4 — усик.

Известный энтомолог И. В. Васильев в 1903 г. занимался разработкой и внедрением биологического метода борьбы с вредной черепашкой в бывшем Купянском уезде Харьковской губернии. Для этого он проводил сборы яиц вредной черепашки в окр. Бахардена Туркменской ССР (бывшее Дурунское приставство, Закаспийской обл.) и выводил из них *Trissolcus vassilievi* (Maur). Возможно, что вместе с *T. vassilievi* была завезена и популяция *O. telenomicida* Vass.

Признак	<i>telenomicida</i>	<i>solidus</i>
Самка		
Брюшко	основание его желтое	целиком темное
Скульптура средней части щитка	продольно-сетчатая (рис. 2, 1)	не продольно-сетчатая (рис. 1, 5)
Длина булав	в 3 раза больше ее ширины и меньше длины трех предшествующих члеников жгутика, вместе взятых (рис. 2, 2).	в 3,5 раза больше ее ширины и равна длине трех предшествующих члеников жгутика, вместе взятых (рис. 1, 3)
Голая косая полоска переднего крыла	не замкнутая, конутри от голой полоски имеется участок, свободный от волосков (рис. 2, 3).	замкнутая, конутри от голой косой полоски нет участка, свободного от волосков (рис. 1, 6)
Самец		
Основной членик усика	по длине равен первым двум членикам жгутика, вместе взятым (рис. 2, 4)	длиннее первых двух члеников жгутика, вместе взятых (рис. 1, 7)

Исследованиями Г. А. Викторова установлено, что кроме яиц вредной черепашки, *O. telenomicida* заражает яйца *Carpocoris* spp., *Dolycoris baccarum* L., *Aelia* spp., *Eurydema ventralis* Kol, *E. ornata* L. *Coreus marginatus* L. (Викторов, 1967).

На территории Калужской обл. вредная черепашка не обнаружена. Можно предположить, что *O. solidus* sp. n. паразитирует в яйцах клопов, перечисленных выше, которые широко распространены и на территории Калужской обл. Однако в *Coreus marginatus* в Молдавии паразитирует *O. corei* Trjapitzin (Тряпицын, 1979).

Голотип *O. telenomicida*, вероятно, утерян. Поэтому сопоставление признаков нового вида *O. solidus* sp. n. и *O. telenomicida* осуществлялось по работе Ферриера и Воже (Ferriere, Voegelé, 1961), в распоряжении которых, кроме оригинального описания и материалов из Марокко *O. telenomicida*, имелся также материал из СССР\*. Ниже приведены отличия *O. solidus* sp. n. от *O. telenomicida* Vassiliev (рис. 2).

Васильев И. В. Вредная черепашка (*Eurygaster integriceps* (Osch. Put.) и новые методы борьбы с ней при помощи паразитов из мира насекомых.—Тр. Бюро по энтомол. Ученого комитета мин. земледелия и гос. имуществ, 1904, 4, № 11, с. 1—72.

Викторов Г. А. Проблемы динамики численности насекомых на примере вредной черепашки.—М.: Наука, 1967.—272 с.

Тряпицын В. А. Новый вид рода *Ooencyrtus* Ashmead, 1900 (Hymenoptera, Encyrtidae) — паразит в яйцах щавелевого клопа *Coreus marginatus* L. (Hemiptera, Coreidae) в Молдавии.—Тр. Всесоюз. энтомол. о-ва, 1979, 61, с. 160—161.

Ferriere Ch., Voegelé J. Les *Ooencyrtus* parasites des oeufs des Punaises des cereales au Maroc.—Cahiers Rech. Agronom., Rabat., 1961, N 14, p. 27—36.

Vassiliev I. Ueber eine neue, bei den Vertretern der Gattung *Telenomus* parasitierende Encyrtus-Art (Hymenoptera, Chalcididae).—Рус. энтомол. обозр., 1904, № 2/3, с. 117.

Калужский пединститут

Поступила в редакцию  
19.V 1980 г.

УДК 595.772

Н. П. Кривошенина

## ТАКСОНОМИЯ ВИДОВ ГРУППЫ *FENESTRALIS* РОДА *SCENOPINUS* LATR. (DIPTERA, SCENOPINIDAE)

При решении вопроса о видовой принадлежности представителей рода *Scenopinus* Latr. в большинстве случаев приходится сталкиваться с определенными трудностями из-за однообразия строения имаго. Трудности увеличиваются также в связи с отсутствием типовых экземпляров многих видов. Несмотря на то, что в последние годы изучению сем. Scenopinidae уделено большое внимание (Kelsey, 1969, 1971, 1974 и др.), до сих пор мы не располагаем точными характеристиками многих, в том числе обычных видов, как например *Scenopinus vitripennis*. Этот вид описан по материалам (самец) из Австрии (Meigen, 1824). Долгое время он рассматривался в качестве синонима *S. fenestralis* (L.), а позднее (Bèzzi, 1903; Kröber, 1913; 1937 и др.) — в качестве синонима *S. glabrifrons* Mg. Несмотря на краткость первоописания, в нем отражены наиболее характерные черты вида: темная сверху головка жужжалец, черная блестящая голова и одноцветные рыжеватые конечности («Kopf sehr glanzend schwarz. Leib schwarz, Ruckenschild etwas metallisch. Schwinger braun: Kopf unten weiss. Beine gelbroth; Flügel glashell».—Meigen, 1824, S. 115). Эти признаки явно указывают на

\* *Ooencyrtus telenomicida* Vass., выведенный из яиц вредной черепашки в Ростовской обл., определен М. Н. Никольской и В. А. Тряпицыным и отправлен 7.X 1969 Ферриеру В. А. Тряпицыным.